




Composition des os

1. avant d'enous occuper des maladies des os, disons quelque chose de la composition de ces pièces solides, qui forment la charpente du corps humain.

2. un os sain du squelette d'un adulte, degagé de membranes, de vaisseaux, de moëlle, ou de sac moëlleux; est blanc, opaque quand il a une certaine épaisseur, dur, et jusqu'à un certain point inflexible. quelque dur qu'il soit, il ne fait point feu avec le briquet, il n'a dans le corps humain, et sur les os, que le mail qui recouvre les dents, qui ait cette propriété d'être dur.

quand il est frappé contre la cire.

3. Ceux de l'embryon ou du fœtus, et de l'enfant naissant, ne ressemblent point à ceux de l'adulte, et varient entre eux, suivant les parties et suivant l'âge. Ceux du crâne de l'embryon, sont d'abord transparents, tissus de fibres déliées, souples et blanchâtres, puis jaunâtres, flexibles, et comme membraneux. Ceux des extrémités de ces mêmes embryons, sont ^{plus promptement} jaunâtres, flexibles et comme cartilagineux.

il reste



2

4. il reste tant aux uns qu'aux autres, pour acquies leur perfection, à s'étendre en largeur en longueur, à s'endurcir, à perdre leur transparence primitive, et à blanchir. Ce sont les ~~accroissements~~ passages d'un état à un autre, et cette induration, avec ce changement de couleur jaune en blanche et vermeil, qu'on appelle ossification; ^{car a} ~~quoique~~ proprement parler, l'ossification, comprend la succession de tous les états, par lesquels passent les os, pour devenir des os parfaits, tels qu'on les trouve dans l'homme fait.

5. mais les os après avoir acquis leur perfection, dégénèrent sans qu'ils soient malades; uniquement par le courant de l'âge. en effet: ils sont moins gros, moins durs, moins pesants dans les vieillards que dans les adultes. on a avancé que l'homme durcissoit en vieillissant. Cela ne doit s'entendre que des membranes, des vaisseaux, des muscles, des tendons, qui en effet ^{des substances terreuses et salines.} s'incrassent fréquemment, et acquiescent en quelque sorte la fermeté des os; mais certainement la solidité des

os

os s'affoiblit avec l'âge; C'est la raison
pourquoi la face des vieillards se rapetisse,
pourquoi leur tronc. se déforme et se
route; il convient donc dans les
maladies qui attaquent la substance
des os, d'avoir égard à ces différents
états. en effet les os comme membraneux,
^{2 comme} ou cartilagineux du fœtus, et de la vie
enfance; sont ~~plus~~ flexibles, ^{2 et des lors} moins
sujets à se fracturer, plus faciles à se
courber, à s'abréver, ^{2 à s'élargir} à se gonfler,
à se déformer, plus prompts à suppurer.
ainsi qu'on peut le remarquer dans les
scrophules, maladie aux quelles les
enfants, et les jeunes gens sont si sujets
tandis que ^{2 l'adulte} les adultes sont ^{2 exposés} plus sujets
à se ~~en~~ fracturer.

distincts et tout à fait
particuliers

état des os dans le fœtus de six
semaines



6. Dès que la connoissance de l'état
par les quels les os passent ^{2 avec l'âge} est négligée
à notre objet ^{2 qui nous} ^{2 présentement} nous y avertit. il faut remonter
fort près de la conception, pour
ne trouver aucune trace sensible
d'ossification, ^{2 indiquée par des indices d'induration} l'embryon n'apas encore
six semaines, que l'on apperçoit
déjà les os du crâne, l'anneau
inférieur

4

inferieure, les vertebres du col, et
du dos; on voit alors sensiblement
les cotes, elles sont avec les clavicules,
les os les plus formes apres les
osselets de l'oreille. les autres os ne
sont encore à cette époque de six
semaines que tres informes, les os —
informes et presque melonnoissables
à cet âge, sont ceux de la machoïre
superieure, les omoplates, l'humerus,
le cubitus, le radius, le femur, le —
tibia, le perone. tous à l'exception
de ceux de la machoïre superieure
et des humerus ^{comme cartilagineux} representent des
espèces de cylindres, qui ne permettent
que difficilement de distinguer —
l'humerus du femur, le tibia et
le perone d'avec le cubitus et le
radius. on decouvre seulement
à cet age, un point osseux, au
centre de chaque os du metatars,
de chacune des phalanges des doigts
des mains, et des pieds, du corps
des vertebres des lombes, de courts
cylindres dans les os du metatars,
la portion particuliere de los
de la hanche

Delachanhe connue sous le nom des
des isles.

les os ou on ne decouvre point alors
de vestige d'ossification, ou de points blancs
endurcis, sont le Sternum, les os
pubis, l'ischion, le Sacrum, le Coccyx, l'os
du Carpe, du Tarse, et généralement
toutes les extremités des os cylindriques,
les bords des os plats, de la tête, des
omoplates, des os des isles.

une remarque à faire sur le Squelette
de cet âge de 6 semaine de Conception,
est que l'ossification y est plus avancée
10 sur les Côtés et le derriere de la poitrine
que sur le devant de cette Cavité, comme
au Sternum, et à la partie inferieure de
la poitrine ainsi que dans les differents
pieces qui respondent au bas ventre.
Car les Côtés ^{et les costales du dos} sont déjà assez bien
formés tandis que le Sternum est alors
comme membraneux, et que si on
excepte ^{deux} un point d'ossification que
l'on observe dans les verébres des
lombes le reste est comme Cartilagineux.
20. quelle est plus avancée aux
extremités Supérieures quelle ne
l'est aux inférieures. le fémur
destiné



6
destinée à être un jour les plus long
et les plus gros des os cylindriques est
alors moins volumineux et moins long
que l'humérus, le tibia et le péroné
sensiblement plus longs dans l'adulte
dans l'enfant, et même dans l'enfant
qui naît au terme de neuf mois —
que ne le sont le cubitus et le radius,
sont plus courts que les deux os de
l'avant bras dans le fœtus de six
semaines de conception

Certains os, comme ceux du crâne
ne sont joints à cette époque que
par le péri-crâne, par la dure mère, et
par une troisième membrane —
intermédiaire qui émane des os mêmes,
après avoir enlevé avec soin le péri-crâne
de dessus les os du crâne la dure mère de
leur face interne, on découvre les
vestiges de cette 3^e membrane qui
émane des os mêmes à leurs bords. Cette
membrane s'ossifie par la suite.

Chacun de ces os est alors
comme enlaidi dans
une loge particulière
que lui fournissent
les deux membranes

7. Si nous suivons cet examen
dans les différents âges du fœtus, nous
en trouverons les os de la face et les
vertèbres mieux formés à 4 mois. ~~et~~
et remarquerons à cette époque un
point d'ossification dans la ~~mergisme~~
~~du sternum~~, un autre dans le ~~pubis~~ l'ischion
et os

~~Cet os n'a plus l'aspect d'une membrane~~
 Se décolorer — Dans l'ischion, et dans chacune des
 premières pièces de l'os sacrum.

à six mois, ^{on voit} un point ou centre d'ossifi-
 cation dans la première pièce du
 Sternum, un autre dans le pubis, qui
 alors n'est plus membraneux, mais plus
 corpu lent et comme cartilagineux.

à sept mois, ^{il y a} trois nouveaux points
 d'ossification dans les pièces inférieures
 du Sternum, un pareil nombre dans
 les pièces inférieures de l'os sacrum, quel-
 ques points dans les pièces latérales
 de l'os dernier os, il en paroît un dans
 le Calcaneum. à ce terme le fémur
 commence à être plus long que l'humérus,
 le tibia et le péroné plus longs que le
 cubitus et le radius.

à neuf mois de conception, on découvre
 un cinquième centre d'ossification dans
 le Sternum, inférieur aux précédents; il
 en paroît un dans l'astragal, les autres
 os du tarse, ceux du Carpe, le Coccyx, et
 les rotules sont encore ~~en partie~~ pres-
 que transparents, souples, et comme
 cartilagineux



Cartilagineux. L'ossification s'est accomplie
 dans les os longs dont les extrémités
 demeurent cartilagineuses, les bords
 de l'omoplate, de los des isles sont ^{encore} entourés
 de cartilages. les os du crâne sont ^{encore} mobiles
 et joints entre eux seulement par des
 membranes.

à sept ans il se manifeste un point
 d'ossification dans la première pièce
 du coccyx, un large point au centre
 de la rotule, c'est là où l'ossification marque
 le plus tard, à cette époque de 7 ans, le reste
 de la rotule qui en borde le centre est —
 cartilagineux et diaphane, les pièces du
 carpe et du tarse sont ossifiées; les épiphyses
 sont prononcées aux extrémités des os longs,
 et leur ossification se fait par le centre
 elles s'ossifient comme la rotule et non pas
 par la surface qui demeure transparente
 plus ou moins de temps. les os du crâne
 s'unissent les uns aux autres si non vers
 la fontanelle qui n'est point encore fermée.

vers la 14^e année les épiphyses ^{elles sont} commencent à se souder
 se souder au corps des os longs, ~~elles se~~
 sont ossifiées dans presque toutes leurs
 parties, les cavités, les têtes des os
 qui jouent les uns contre les autres

je pourrai placer ici mon travail sur la
 formation de la tête.

Dans

à l'âge de

Dans les articulations sont modelées
Comme elles le seront, le reste de la —
vie, les os n'ont point encore acquis —
alors leur dureté non plus que la —
longueur et le volume qu'ils ont coutume
d'avoir dans la maturité d'âge.

8 il y a donc des os qui procèdent —
d'une substance comme membraneuse,
d'autres qui émanent d'une substance
comme cartilagineuse; d'autres enfin
qui comme le pubis passent de l'état de
membrane, à celui de cartilage avant
de devenir des os parfaits; et l'on pourroit
conjecturer qu'ils ont tous eu un principe
membraneux, pourvu que par ^{le mot de} membrane,
on n'entende point les membranes ordinaires,
mais seulement une substance flexible,
filamenteuse, étendue en lames, qui a
la propriété particulière d'admettre
les autres parties constituantes des os. —
Ce qu'il y a de bien certain, c'est que
ces membranes par où commencent les
os, d'abord fort transparentes, minces,
épaississent, jaunissent et avec le temps
deviennent ambreées et visqueuses. Tous
ces états qui se succèdent, sont autant
de pas faits vers l'ossification, ensuite ils
se chargent

voici aujourd'hui d'un sujet de 5 ans et
un de 4. on en fait des types 2. y faire les
progresses de l'ossification des épiphyses des
extrémités supérieures et des extrémités
inférieures
Je voudrais si elles s'ossifient plutôt aux
bras qu'aux jambes et aux cuisses
à l'extrémité sup. d'un os que l'inférieure
S'il est constant qu'elles commencent à
s'ossifier par le centre.



aler ici un morceau sur les épiphyses.

Se chargent de la matière qui les —
 durcisent et dont elles tiennent à la fin
 leur blancheur. mais lorsque par
 maladie, ou autrement on dépouille
 les os des adultes de la substance qui
 les endurcisait, on retrouve à la
 vérité après ce dépouillement, une
 substance flexible, ou avait été
 introduite la substance qui
 endurcisait, elle fait ^{+ cette substance flexible} comme
 le support de ~~cette~~ substance
 endurcissante, et elle est comme
 le canevas des os, et ressemble —
 beaucoup alors à une éponge. mais
 on ne remarque point de différence
 sensible, entre le canevas ou l'éponge
 d'un os qui tire son origine d'une
 membrane; et celui d'un autre os
 qui procède d'un cartilage. Ce qui montre
 qu'il s'est opéré dans ces espèces de membranes
 et de cartilages qui se sent par ou les os
 commentent des transmutations, quelquen
 soient les causes, qui les ont amenées
 de ces états de membranes et de cartilages
 à celui d'éponge.

g. nous venons d'indiquer de la terre,
 une éponge dans les os, il y a aussi un
 acide ^{il y a} c'est le phosphorique, une —
 matière

+ et cet acide est
 le phosphorique

(a) c

par an

nomme

l'avant

sur le

autres

par 1.

(b) p

(c) p

os ceter

est ten

(d) c

nourri

gluant

charge

nouvel

(e) p

49. Co

que len

lymph

carto

(a) Courtial parle de ces glandes d'après un anglois pag 48. cet anglois qui ne nomme point est probablement Clayton l'auteur qui élève une hypothèse ridicule sur les glandes des os, des nerfs, et des autres parties et sur leur usage. de ossibus pag 14 (nouvelles obs anatomiques sur les os)

(b) préface du livre de ossibus.

(c) de Corporis humani fabrica lib 1^{er}.

os ceterum hominis partium maxime est terreum, ac proinde aridissimum

(d) Courtial écrivoit en 1705 que le suc nourricier des os étoit une partie fort gluante et fort visqueuse de la lymphe chargée de beaucoup de terre et de sel nouvelles obs. anatomiques sur les os.

(e) mem de l'acad. des Sci. an. 1743 pag. 39. le savant physicien conclut de ses expériences que l'endurcissement des os est due à un dépôt de lymphe et de terre des os. cartus affusc

matière visqueuse ou colle, des productions venant du supérieur des vaisseaux sanguins, des nerfs, de la moëlle, ou bien un suc moelleux, et de la lymphe combinée avec la matière terreuse. on a prétendu qu'il y avoit aussi dans les os des vaisseaux lymphatiques, des glandes (a) des vaisseaux qui rapportoient la moëlle surabondante, des clouds, qui unissoient des lames dont on les a cru composés, j'en ai rien vu dans les os qui ressembloit à tout cela, j'en parlerai que des parties constituantes des os dont l'existence est bien constatée.

10. on ne sçauroit douter que les os lors qu'ils sont tout à fait formés et sains, ne contiennent une quantité plus ou moins considérable de terre blanche, dont ils tirent leur couleur et leur dureté. C'est une vérité qui avoit été reconnue par galien (b) ^{par} vesal (c) Courtial (d) par mr Duhamel (e) et par beaucoup d'autres écrivains; elle est confirmée par différents procédés, à l'aide des quels on la separe des autres parties integrantes des os. ce qui s'opère de deux manières ou

ou en détruisant dans les os tout ce qui n'est point terre pour ne laisser subsister que la seule terre qui en provient; ou bien en enlevant auf os toute la terre qu'ils contiennent pour conserver les autres parties qui les composent.

Il y a ^{quatre} ~~procédés~~ ^{procédés} pour laisser subsister la terre des os, en détruisant les autres substances qui entrent dans leur composition. La calcination dans une retorte (a), ou bien à feu nu (b), ^(c) leur Coction dans la machine de papin. et la malévation jusqu'à la ^{et la dissipation} pourriture des substances animales qu'ils contenoient. la terre dans chacun

(a) Si l'on soumet un os à l'action du feu, dans une retorte, il s'élève d'abord du flegme, ensuite des nuages blanchâtres très puants que l'on croit être un alkali volatil, puis un peu de soufre, après cela un sel volatil grossier qui s'arrête au col de la Cornue, enfin une huile très puante; et l'on trouve dans la retorte un os noir friable, sonore, qui blanchit à un feu violent de reverbere, devient poreux, plus léger, plus friable et offre une espèce de chaux ou de terre. *ostéologie anonyme, intitulée nouvelle ostéologie chez laurent d'houry 1709 pag 20. et abrégé d'anat de laurent heister paris 1724 pag 19.*

(b) un expédient fort simple, et très connu pour séparer la terre des os à un grand degré de pureté, je veux dire exactement déagée des substances étrangères à cette terre. est de les calciner à blancheur au feu nu. La terre résiste à l'action du feu, mais toutes les autres parties integrantes d'elles y sont consumées. les chimistes qui ont recherché une terre pure pour la construction de leurs coupelles, employent cette terre de préférence, au plâtre et aux cendres de bois. on fait des coupelles avec la terre des os de bœuf, de mouton, de cheval & j'ignore si les aliments dont on se nourrit les frugivores, et les carnivores n'introduisent point quelque différence dans la nature

Dans chacun des ces procédés fait encore
 masse après l'expérience, et représente la
 forme de l'os au quel elle a appartenu —
 seulement elle est plus légère que n'est il
 l'os plus friable, plus fragile plus sonore
 qu'avant l'expérience. on a des exemples
 de fragilité

nature ou les propriétés de la terre de l'os. on seroit presque tenté de le soupçonner,
 sur la difficulté qu'il y a de faire de bonnes capsules avec la terre de l'os du porc, tandis qu'on
 parvient à en faire de bonnes avec celle des autres os dont j'ai parlé. Diet. de med Tom 3
 Col. 907.

(c) l'effet que l'on se propose d'obtenir avec le digesteur de papin à l'action duquel
 on soumet des os de bœuf de mouton et d'autres animaux pour en avoir les sucs; est encore
 fondé sur cette préparation que l'on fait de la terre des os, qui n'est point une substance
 nourricière, et qui ne serviroit en rien à la perfection du bouillon ou des tablettes
 nutritives, d'avoir des parties alimentaires engagées dans toute cette terre. on ne
 consomme point ces sucs nourriciers avec le digesteur comme on les consomme par
 la calcination. on les fait passer dans l'eau dont on la remplit, elle s'en charge
 et forme le bouillon. mais il faut pour dégager d'un os tous les sucs propres à faire
 du bouillon, le soumettre à des expériences répétées dans cette machine. la 1^{re}
 on dégage beaucoup, la 2^e moins ainsi de suite, et si on veut en obtenir l'avantage,
 on pile les os, avant de les rejeter pour la 2^e fois dans le digesteur. quant aux os on
 les retire après l'expérience beaucoup plus légers, plus fragiles propriétés qu'ils ont
 acquis antérieurement qu'ils ont au dégage de leur terre les substances qui en se liant
 avec elle lui donnoit plus de corps. même sur l'usage du digesteur économique du
 digesteur de papin par l'adoption des belles lettres sciences et arts de Clermont formant



De fragilité des os dans l'animal vivant
qui dependent ~~egalement~~, de la
dissipation, et sans doute de l'alteration
des Substances, spongieuses, visqueuses
et onctueuses des os

(a) mem de la acad des sciences ann. 1768 pag 30

12 la seconde maniere de —
degager la terre des os, consiste à
la leur enlever à l'aide des acides
mineraux, en conservant a les mêmes
os les autres Substances qui entrent
dans leur Composition. j'en trouve dans
plutarque la preuve ~~comme~~ ^{quoique} que
les grecs savaient ramollir les os
a leur enlever leur terre.

mais ce n'est que de nos jours, que
l'on est revenu à cette connoissance,
et le procede en est du a un herissant,
de l'academie royale des sciences (a) il —
consiste à mêler une partie d'esprit
denitre fumant à quatre parties d'eau
communes, et à plaler dans ce mélange
les os que l'on se propose de depouiller de
leur terre. l'acide degage peu à peu la
terre des os soumis à son action, l'en
charge

(a) os fossiles: leur analyse. Jean Samuel
 Carl. lapis lydius philosophico-pyrotech-
 -nicus ad ossium fossilium docimasim
 analiticè demonstrandam adhibitus. Francofurti
 ad moenum 1703. in. 8.

Je n'ai sous les yeux que l'extrait de
 cet ouvrage par les auteurs des journaux
 de Leipsick, avril 1704 pp. 190 seqq. il en
 résulte que les os fossiles sont de véritables
 os, que leur structure et leur composition
 est celle des os. que comme les os des
 animaux ils donnent à l'analyse une
terre qui est particulièrement
calcaire et susceptible de se convertir
en verre, de chaux empyreumatique
 et du phlegme; que si on les emploie
 en médecine, on ne peut s'en servir que
 comme absorbants; que la marne (marga)
 qui les enveloppe ne doit point en imposer
 qu'elle les altère véritablement à
 l'extérieur en en pompant chaux et
 humidité, en sorte qu'il ne reste que
 la terre calcaire, mais que cette
 altération n'est que superficielle et
 que les os sous cette croûte conservent
 leur nature ordinaire. Ce Ci montre que
 les os fossiles que l'auteur a examinés étoient
 encore fossiles et marneux qu'à l'extérieur ou
 ils étoient simplement calcaires et qu'ils
 conservoient encore de leur substance animale
 intestinale

charges tandis que le reste des os acquiert
 de la souplesse à mesure que la terre lui
 est enlevée. la liqueur qui tient la terre
 en dissolution ayant été évaporée à
 un feu doux jusqu'à pellicule. donne des
 cristaux huileux, jaunâtres, ayant la forme
 de lames aplaties, comme beaucoup de sels
 neutres vitrioliques à bases terreuses,
 ce sel selon moi herissant est un nitre d'
 base terreuse. mis dans un creuset sur le
 feu jusqu'à parfaite calcination il donne
 une terre blanche. on obtient ^{encore} cette terre,
 en précipitant avec un alkali fixe, celle
 qui est dissoute dans la mixture d'alide
 nitreux et d'or. on filtre, on lave la terre
 qui reste sur le filtre jusqu'à ce qu'elle
 soit tout à fait insipide. Dans cet état
 et quand elle est sèche elle est blanche.
 très légère comme poudreuse, c'est une
 véritable terre calcaire; l'une des plus
 pures que l'on connoisse; susceptible de
 se convertir en verre (a) non pas par elle
 même ^{et à un feu vif} mais en y joignant
 de l'argile. ^{et la soumettant à un feu vif} il paraît par les expériences
 de Mr quaternier-Disjournal sur la
 marne, la craie, la pierre à chaux,
 et la terre des os. que les quatre terres
 ne sont qu'une seule et même ^{terre}

Calcaire



Calcaire, si c'est que cette terre calcaire
est moins pure dans la marne, que dans
la craie, dans cette dernière substance
que dans la pierre à chaux, et dans
la pierre à chaux que dans les os (a)

13 il y a donc dans les os une
terre calcaire très pure, moins abondante
à mesure que l'on approche de l'enfance,
et de la vieillesse; deux termes de l'âge
où les os sont plus disposés à se déformer,
^{moins compactes} moins compactes. Cette terre calcaire
à la propriété de se charger des
substances colorantes de certains
végétaux, et de se porter dans les
os avec elle. ^{la racine de} la garenne (b) la racine de la

plante nommée Caille-lait (c) la
rougissent. on enlève cette couleur rouge
aux os des animaux qui ont été nourris
de garenne, en les détrempant de leur
terre avec la mixture d'eau et d'alide
nitreuse, preuve qu'elle réside dans
la terre des os. Cette couleur rouge
de certains végétaux jointe aux aliments
est donc un moyen de plus pour
suivre les progrès de l'ossification et
l'ordre suivant le quel la terre s'engage
dans les os

16
(a) mémoire de Mr. Quatrecas - Disjunctive
au journal de physique 1781 ouvrage qui
a remporté le prix à l'académie de Rouen, sur
les moyens d'assigner des différences, entre
la marne, la craie, la pierre à chaux la
terre des os.

le moyen dont on se sert dans les
recherches pour avoir la terre des os
pure est de faire dissoudre des os bien
torréfiés dans l'alide nitrique, et
de les précipiter ensuite de cette
alide par l'alcali fixe, et de
lister le précipité jusqu'à ce que
l'on ait lieu de croire qu'on l'a
entièrement débarrassé de l'alcali
pag 5. Cette combinaison de la
terre pure des os avec l'alide nitrique
forme une sclénite.

la terre des os précipitée de la
sclénite ostéale et soumise au feu
ne fond point si c'est auprès des
parois du creuset, ou la matière
argilleuse du creuset lui sert de
fondant. pag 14.

la terre des os traitée avec
les acides minéraux n'offre rien de
particulier que des sels calcaires
plus parfaits, mieux cristallisés,
surtout du nitre, et du sel
marin moins déliquescens à raison
de la pureté de cette terre pag. 14.

(b) Mr. Belchier chirurgien de
Londres a fait voir à la Société royale
des os de Cochon

ite de la note 6. de l'autre part)
 des os de Cochon devenus rouges. —
 animal avait mangé du son qu'on avait
 & bouilli avec des toilles peintes, dans
 e préparation, de fer, d'alun, de sel de
 tene, et qu'ensuite on avait mis —
 myer dans une decoction de garenne
 en seclairer sur la cause de la douleur
 os du Cochon, il nourrit pendant
 jours un Coq avec de la menueaille
 quelle il avait mêlé un peu de —
 lerie de garenne et tous les os de
 l'animal rougissent. ^{Chas. Dédinbourg}
 4. p. 36. on emploie la raline
 ais les feuilles lestiges de la garenne
 eurent servir

(c) Cette note est relative à
 age 10. le Caille-lait rougit les
 hist de l'ad. des 14 ann. 1449. pag.
 Mr Gueltard ayant nourri des
 lets avec la raline de Caille-lait
 une blanche, et la raline de Caille-lait
 une jaune ainsi qu'avait la raline
 gratteron mises en poudre. leur faisant
 idro a Chalun separement un peu environ
 jours et continuant ainsi pendant
 de 15 jours trouva que chaque poulet
 et les os rougis par Chalun de la raline
 a cette difference que Cail qui usent
 Caille lait maigrissent perdirent l'appetit
 ient eschauffés au lieu que celui qui fut
 nourri de gratteron avait l'appetit et prit
 le bon point. il n'y a que les ralignes de
 plantes qui ayent la propriété de rougir
 on. mem de l'ad. an. 1446 pag. 98.

Dans les os. après que Mr Belchier
 chirurgien de l'ordre
 se fut assuré que la raline de garenne
 rougissait les os des animaux. plusieurs
 physiciens célèbres à la tête des quels
 il faut compter Mr Duhamel du
 Monceau, Mr Dehttef et Mr Fougereux
 de Bondaroi, ont fait avec cette raline
 des experiences sur les animaux dont
 les résultats sont intéressants. je ne
 conserverai point l'ordre des dates
 de leurs decouvertes, il m'a paru plus
 utile ^{et plus court} de suivre celui des effets.

La garenne qui rougit incontestab-
 lement les os des animaux. ne
 rougit point Cail des animaux qui
 sont dans le sein de leur mere
 quoi que celle-ci ait été nourrie
 de garenne.

Les cartilages qui doivent s'ossifier
 rougissent seulement à mesure qu'ils
 s'ossifient.

Les os des jeunes animaux qui sont
 peu de tems à prendre toute leur
 croissance, rougissent beaucoup plus
 promptement que Cail des animaux
 qui croissent lentement 24 heures
 suffisent pour teindre en rouge

Cail



Ceux d'un pigeonneau. ou tout au plus
trois jours, en joignant à la pâte une
dragme de garence. Tandis que si le
pigeon est parvenu à un âge avancé,
les os prennent à peine une teinte
couleur de rose, après trois mois d'usage
de pâte alagarence.

Il en est de même des gros animaux quand ils sont vieux
leurs os ne rougissent que faiblement
et encore ce n'est qu'au bout d'un
temps considérable.

à un âge moins avancé tous
les os rougissent sans distinction,
mais avec des nuances différentes,
les uns prennent une belle couleur
de carmin, les autres une couleur
pâle, il y en a qui rougissent
davantage dans une partie, et
moins dans une autre partie,
tout cela est dans l'ordre et dépend
de ce que tous les os ne reçoivent
point leur terre à la fois, que les
uns sont plutôt formés vers
certaines régions du corps, que
vers d'autres, et qu'en général,
les os plats ainsi que les os longs,
sont plutôt pénétrés de terre
à leur

à leur Centre ou à leur partie moyenne
qu'à leur bords ou à leur extrémités.

Les os les plus épais, et qui doivent
un jour être les plus durs, sont
ceux qui prennent une couleur
plus foncée, si la garenne est donnée
à un âge où la terre puisse encore
être engagée librement dans les os.

Durant

Si on nourrit un gros animal —
comme un cochon, ~~durant un certain~~
~~temps~~ quinze jours, avec de bons
alimens, quinze autres jours avec
les mêmes alimens aux quels on —
aura joint de la garenne, et que
l'on alterne ainsi. on trouvera —
dans le corps des os cylindriques —
après les avoir sciés en travers, une
couche rouge profondément, ensuite
une couche blanche, puis une autre
couche rouge, l'expérience est de
M^r Duhamel.

il n'y a que les os qui rougissent —
dans un animal vivant par l'usage de la garenne, les autres —
parties du corps qui ne reçoivent point
de terre comme les os, ne rougissent
point, seulement les tendons ^{des pattes} des
volatils, qui s'ossifient, les os de leur
Corne

Cornes rougisent aussi, mais le bec
et les ongles ne rougisent point.

*
enfin on a remarqué que cette
couleur rouge se dissipoit dans
l'animal vivant à mesure que
l'on s'éloignoit d'elles, ou on
avoit cessé de joindre de la garence
à la mangeaille. elle se dissipé
aussi des os des squelettes

la garence est un ingrédient mal
sain, les animaux qui en usent trop
deperissent et meurent. j'ai fait cette
remarque parce que j'ai vu l'usage
de cette plante introduire dans
la pratique, et qu'à cet égard il
faut être en garde sur ce qui pourroit
en arriver.

14. le Caille-lait Comme nous
l'avons dit colore aussi les os, on en fit
entrer la poudre dans la pâte de
quelques lapins pleins, le lait des
mères devint couleur de rose, les
os des petits naissans se trouveront
fortement colorés de rouge, et ceux
des mères n'en eurent aucunes teintes,

(a) Cette observation est de M.
Guettard de l'Académie royale des
Sciences. ainsi le Caille-lait Comme
la garence

(a) hist. de l'acad. ann. 1744. p. 54

* platener mai 1738 apud haller
disput. anat. tom 6 pag. 246 et seq en
rendant compte des curiosités de Mr
Nicol nichols anatomiste d'Oxford
rapporte que la couleur rouge comme
qu'on a des os de jure avec la garence
n'est nulle-part aussi éclatante
que sur les dents, mais sur la partie
interne des dents qui étoit renfermée
dans les alvéoles, et pourvue de
porosité, car la partie qui étoit
à l'air et hors des alvéoles conservoit
sa blancheur ordinaire.

Dans q
est la
les autr
Des os

"on a
laborat
des os d
fort ne
remar
donne
pur
gr
reste
pese
et
tout
même
la rédu

Colore les os en rouge, et les colore —
Surtout dans les jeunes Sujets à mesure
que l'artere qui doit les endurcir s'i
introduit, et non pas aussi facilement
dans les vieux dont les os ont pris leurs

...ant plus
se le font
immode
venue, les
que la
ur est
ble.

Dans quelle
est l'artere des os avec
les autres parties constituantes
des os.

est chargé
et relevoir,
qu'elle est la quantité proportion
gardée avec le poids des autres —
parties integrantes de l'emême
os.

on a analysé dit Duverney au
laboratoire de l'Académie des Sciences
des os de jambes de boeuf concassés
fort nets et fort secs, et l'on a —
remarqué que chaque livre a —
donné deux onces 6 gros de liqeurs
purement aqueux, une once 6
gros 24 grains de sel volatil, le
reste des os calciné et tout sec
pesoit 3 onces 5 gros et demi
et étoit de la même presque
toute pare analomie Tom
même pag. 337. voyez ci dessus
la réduction de cette expérience A

une once d'os provenant d'environ
quatre côtes vraies d'une personne saine,
et une autre once d'os tirée d'environ
six côtes vraies d'un sujet cancéreux dont
tous les os étoient très fragiles furent
mises séparément dans l'esprit de
nitre affoibli, j'etai de l'once d'os sain
deux gros quarante cinq grains, ou 189
grains



Cornes rougissent aussi, mais le bec
et les ongles ne rougissent point.

*
enfin on a remarqué que cette
couleur rouge se dissipoit dans
l'animal vivant à mesure que
l'on s'éloignoit d'utérus ou on
avoit cessé de joindre de la garenne
à la mangée. elle se dissipe
aussi des os des squelettes

la garenne est un ingrédient mal
sain, les animaux qui en usent trop
deperissent et meurent. je fais cette
remarque parce que j'ai vu l'usage
de cette plante s'introduire dans
la pratique, et qu'à cet égard il
faut être en garde sur ce qui pourroit
en arriver.

14. le Lait Comme nous
avons dit Colore aussi les os, on en fit
entrer la poudre dans la paille de
quelques lapins pleins, le lait des
mères devint couleur de rose, les
os des petits naissans se trouveront
fortement Colores de rouge, et ceux
des mères n'en eurent aucune teinte,

(a) Cette observation est de M.
Guettard de l'Académie royale des
Sciences. ainsi le Lait Comme
la garenne

(a) hist. de l'acad. ann. 1744. p. 54
* platener mai 1738 apud haller
disput. anat. tom 6 pag. 246 et seq. en
rendant Comptes des Curiosités de M.
Nicol nichols anatomiste d'Oxford
rapporte que la couleur rouge comm.
quée ad os de jors avec la garenne
n'est nulle-part aussi éclatante
que sur les dents, mais sur la
partie des dents qui étoit renferm.
dans les alvéoles, et pourvue du
perioste, car la partie qui étoit
ouverte et hors des alvéoles conser.
sa blancheur ordinaire.

eau	2 onces	67 gros	grains
Sel volatil	1	67	24
terre	3	45	30
	8 onces	177	60
done	4 onces	67 gros	12 grains de perle
par la distillation	10	0	00
et dont on ne			
rend aucun compte			

Moyen des résultats de cette expérience

ilore —
 2 amefure
 urlii Si
 i faliblement
 pris leur
 & plus
 ie le font
 immode
 irene, les
 que la
 ur est
 ble.

Dans quelle proportion
 est la terre des os avec
 les autres parties constituantes
 des os.

„on a analysé dit duverney au
 „laboratoire de l'Académie des Sciences
 „des os de jambes de bœuf concassés
 „fort nets et fort secs, et l'on a
 „remarqué que chaque livre a
 „donné deux onces 6 gros de liqueur
 „purement aqueuse, une once 6
 „gros 24 grains de sel volatil, le
 „reste des os calciné et tout sec
 „peseoit 3 onces 5 gros et demi
 „et étoit de la terre presque
 „toute pure analysée Tom
 „premier pag. 337. voyez li dessus
 la réduction de cette expérience A

Is mais quand
 de toute la terre qu'il peut relever,
 quelle est la quantité proportion
 gardée avec le poids des autres
 parties integrantes de la même
 os.

une once d'os provenant d'environ
 quatre côtes vraies d'une personne saine,
 et une autre once d'os tirée d'environ
 six côtes vraies d'un sujet cancéreux dont
 tous les os étoient très fragiles furent
 mises séparément dans l'esprit de
 nitre affoibli, jetai de l'once d'os sain
 deux gros quarante cinq grains, ou 189
 grains



grains de terre; et de l'once d'or —
 Canlerus deux gros quarante six
 grains ou 190 grains de terre; ainsi
 l'once de l'or sain a produit un grain
 de terre de moins que l'once d'or malade.
 Cette terre qui paroistoit semblable
 dans les deux sujets étoit environ le
 tiers dans les deux expériences du poids
 du poids des or soumis à l'action de
 l'esprit de nitre.

Ces résultats quoi qu'à peu de
 choses près semblables au premier
 coup d'œil, ne l'ont pas égaré —
 ont été fort différents. Car on
 doit se rappeler qu'il a fallu seulement
 près de quatre lites d'or sain —
 pour produire une once, tandis
 qu'il en a fallu jusqu'à six, du —
 sujet Canlerus pour obtenir le
 même poids d'une once. or les quatre
 lites d'or sain ont produit entre elles
 a un grain près autant de terre
 que les six lites d'or malades.

+
 il fut plus facile de filtrer
 la liqueur ou avoient été les or Canlerus
 que

+ je versai sur l'alide qui tenoit les
 terres en dissolution un alcali fixe

que de filtres elle ^{ou} avoient ele
 les os sains; le preligue de la premiere
 etoit moins gros que celui de la seconde
 Ce qui montre pourquoy les os Carleses
 sont si fragiles cest qu'ils sont depouilles
 d'une partie de cette substance
 onctueuse qui donne au spongieux des
 os de la Douleuse et qu'en outre ils ont
 proportion gardée ~~est~~ moins de terre calcaire.

il faudra repeter et varier
 les experiences

proportion gardée



(a) voyez la note (a) de la page 12.

16^e mais Comment es-t-ce que
 Cette terre se trouve placée dans
 les os, y est-elle libre, ou bien y est-
 elle enchainée par quelque ^{substance} que
 li fixe pour ainsi dire et li
 retienne. En faisant des expériences
 relatives à la dissolution des os,

la colle
 et l'acide des os

je remarquai dans quelques unes d'elles
 qu'il sortoit un suc visqueux ^{glaumateux}
 de la surface même des os de la tête
 de jeunes chiens, car les dans les jeunes
 animaux que l'on remarque plus facilement
 ce suc visqueux des os. et cette substance
 n'avoit point échappée à Coartial,
 qui jugeoit le suc nourricier des os une
 partie fort gluante et visqueuse de
 l'lymphe, chargée de beaucoup de
 terre et de sel. ^{effectivement} l'analyse chimique
 des os à la retorte a donné du phlegme
 des nuages blanchâtres très puants
 que l'on croit être un alcali volatil (a)
 un peu de soufre et après cela un
 sel volatil grossier qui s'arrête au
 col de l'alomne enfin une huile
 très


le travail de Mr Nicolai de nanci
de m. sage
de m. l'abbé sur le phosphore tive

de Mr Berniard sur la différence
analyses comparativement entre
il y a un m. de Mr Berniard sur la terre
sur la terre calcaire en g. au journal de l'abbé
j. années 1782 p. 43. ouvrage avo
pud Halle diop chi. tom 4. pag 541

un memoire de Mr de Morveau
terres simples
autre de Mr romé de l'isle
deux j. au journal de
l'abbé

la gris
certain

le p.



++ Mais les progrès que la chimie a fait de nos
jours ont ~~encore~~ ^{beaucoup} répété du plus de lumière sur cette
matière, on doit à Mr Sage de l'acad des Sciences
l'analyse suivante des os de bœuf.

Mr Sage ayant pris la tête d'un fœtus frais de
bœuf la cassée à l'aide d'un marteau et d'un ciseau,
il en a retiré par la distillation moitié de son poids
d'huile noire très fétide, et d'alcali volatil
l'alcali volatil et l'eau ont paru faire le g. du
produit de la distillation. jusqu'à il n'a rien qu'on ne connait
le charbon qui restoit, ayant été réduit à
l'état de braise, a perdu un vingtième de son poids.

Cette braise animale ayant été pulvérisée
et mêlée avec deux tiers d'huile de vitriole
étendue ensuite de 10 parties d'eau, a produit
par l'évaporation moitié de son poids de sel
acide phosphorique vitreux blanc. celui-ci
rend par la fusion moitié de son poids d'un verre
bleuâtre et transparent. Le verre étant distillé

très puante. voilà donc très certainement
et de la colle, et une substance saline
dans les os. mais aujourd'hui que l'on
retire en grande quantité du phosphore
des os, on a la preuve complète qu'ils
contiennent un acide phosphorique,
de sorte que la terre est jointe d'ans
dans les os non seulement aux parties
molles, ~~mais encore~~ ^{non seulement} à certains sucs huileux
animaux qui la défendent, ^{contre certains sels} mais encore
à cet acide qui en fait un sel et
se neutralise avec elle et ~~la rend~~
l'abbé * Muller (a) dès 1704

a. Pampoules de

fil

les

rent

l'acide

a

ce qui

reste

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

restes

16 mais Comment es-t-ce que
 Cette terre se trouve placée dans
 les os, y est-elle libre, ou bien y est-
 elle enchaînée par quelque ^{substance} qui
 li fixe pour ainsi dire et li
 retienne. En faisant des expériences
 relatives à la dissolution des os,
 je remarquai dans quelques uns d'elles
 qu'il sortoit un suc visqueux ^{glaucos}
 de la surface même des os de la tête
 de jeunes chiens, car les dans les jeunes
 animaux que l'on remarque plus facilement
 ce suc visqueux des os. et cette substance
 n'avoit point échappée à Courtial,
 qui jugeoit le suc nourricier des os une
 partie fort gluante et visqueuse de
 l'lymphe, chargée de beaucoup de
 terre et de sel. ^{effectivement} l'analyse chimique
 des os à la retorte a donné du phlegme
 des nuages blanchâtres très puants
 que l'on croit être un alcali volatil (a)
 un peu de soufre et après cela un
 sel volatil grossier qui s'arrête au
 col de la cornue enfin une huile
 très

(a) voyez la note (a) de la page 12.

la colle

et l'acide des os

17 Mais les progrès que la chimie a fait de nos
 jours ont ~~encore~~ ^{beaucoup} répandu plus de lumière sur cette
 matière, on doit à Mr Sage de l'acad des sciences
 l'analyse suivante des os de bœuf.

Mr Sage ayant pris la tête d'un fœtus frais de
 bœuf la cassa à l'aide d'un marteau et d'un ciseau,
 il en a retiré par la distillation mortuë de son poids
 d'huile noire très fétide, et d'alcali volatil
 l'alcali volatil et l'eau ont paru faire le ^{gros} du
 produit de la distillation, jusqu'à ce qu'on ne connut

le charbon qui restoit, ayant été réduit à
 l'état de braise, a perdu un vingtième de son poids.

Cette braise animale ayant été pulvérisée
 et mêlée avec deux tiers d'huile de vitriol
 étendue ensuite de 10 parties d'eau a produit
 par l'évaporation mortuë de son poids de sel
 acide phosphorique vitreux. Celui-ci
 rend par la fusion mortuë de son poids d'un verre
 bleuâtre et transparent. Ce verre étant distillé

huile
d'acide igné
d'acide phosphorique
de natrum
de terre absorbante

leponge des os.

très puante. voilà donc très certainement
 et de la colle, et une substance saline
 dans les os. mais aujourd'hui que l'on
 retire en grande quantité du phosphore
 des os, on a la preuve complète qu'ils
 contiennent un acide phosphorique,
 de sorte que la terre est jointe dans
 dans les os non seulement aux parties
 molles, ^{non salines} mais ~~encore~~ à certains sucs huileux
 animaux qui la défendent, ^{contre certains salins} mais encore
 à cet acide qui en fait un sel et
 se neutralise avec elle et ~~la terre~~
 la chaux * Muller (a) dès 1704 —
 trouva que les os étoient composés de
 molécules terrestres et d'un sel volatil
 unis ensemble par une huile.
 # mais ce qui le fixe encore, m'ont dit donc, premièrement
 14 l'acide est combiné, on en a retiré avec
 à un os, avec la mixture d'eau et d'acide
 nitreux, on a enlevé en même temps à
 cet os la portion d'acide phosphorique qui
 neutralisoit cette terre. et il ne reste
 plus ensuite de l'os que des parties animales
 molles et fluides les unes molles les autres
 fluides. toutes les parties molles restantes
 sont comme la charpente ou le canevas
 de l'os, de ces parties molles la principale
 Si on a

- Si on a egard à son volume est
 l'éponge des os. Cette éponge selon
 un herissant " est l'organe secretive
 " de l'atome, un espèce de parenchyme
 " cartilagineux, qui ne s'ossifie jamais
 " proprement parler, et qui ne
 " change jamais de nature; il conserve
 " son caractère cartilagineux tant
 " que l'os à qui il appartient est existant.
 " C'est dans les vaisseaux fins et déliés
 " dont cette première substance n'est
 " qu'un tissu en forme de réseau disposé
 " par couches et par feuillets, que se fait
 " la circulation des liqueurs destinées
 " à la nourriture des os (a). il estroit
 " continue aux fibres ligamenteuses des
 " articulations, et aux tendons qui
 " s'implantent dans la substance même
 " des os.

pour m'assurer de ses propriétés
 je coupai en travers un fémur de falon
 a en enlever un anneau épais seulement
 d'environ deux lignes, cet anneau mis
 de l'atome et ramolli dans la mixture
 d'eau et d'alide nitreuse reporté sur
 le bout du fémur à l'endroit dont
 il avoit

(a) mem de l'alide des sions année 17
 pag. 324.

avoit été rétranché, il remplit
 exactement la place qu'il avoit
 occupé, durant qu'il étoit osseux, ne
 débordant point à l'extérieur de
 l'os, non plus que du côté d'alaral
 osseux, de sorte que quoi que devenue
 de l'os, il avoit conservé et la forme
 et le volume qu'il avoit lors qu'il en
 étoit chargé, ensuite je le mis à secher,
 à mesure qu'il secha il se rapetissa en
 tous sens, quand il fut bien sec, jaunâtre,
 comme transparent, et presque cassant
 je le fis macérer dans de l'eau tiède, il
 s'y ramollit, s'y gonfla comme
 auroit fait une éponge, y remis le
 volume et la forme qu'il ^{il avoit} eu au sortir
 de l'eau aliévolée, et avant d'être
 desché, m'appuyant sur cette expérience
 et sur beaucoup d'autres que j'ai faites
 sur la même substance, et qui toutes
 la confirment, j'ai cru devoir donner
 à ce Carévas des os quand il est
 parvenu à l'état où nous venons de
 voir qu'il se trouve dans un os parfait,
 le nom d'éponge ou de substance
 spongieuse des os, dans cet état et prise
 de terre

^{elle}
terre est souple, compressible, extensible
fort poreuse

j'ai conclu de ces expériences que
la substance spongieuse, est naturellement
dans un os sain, aussi étendue ^{qu'il} quelle se
puise, sans que la terre ou le sel neutre
qui la remplit forme de terre et d'acide phosphorique
Contribue en rien à son expansion;
quelle y est dans un état d'imbibition,
et de ramollissement. ramollissement —
qui ne peut avoir qu'un terme, passé
lequel il seroit morbifique.
enfin que les autres parties qui —
concourent avec le sel neutre à
la composition des os, remplissent
avec lui les vides de cette substance.

Le que l'on enlève par le digesteur
de papin, de substances alimentaires, ^{aux os} + il en vient aussi
viennent surtout de cette éponge, de la
Colle, des sucs muqueux, du persil et des
vaisseaux qui s'y étoient introduits.

le bouillon qui en provient, est — + celui que l'on tire
presque tout en gelée comme ^{et} dans de
la corne de cerf; nouvelle preuve d'existence
de la viscosité dont on a parlé ci devant.
et il est d'observation que les —
^{epiphyse}
apophyses y rendent plus de sucs
que

Duperioste

halles dans un memoire sur les os
 imprimé avec l'ap. de Mr. Fournier par 1760.

que les autres parties des os.

16 le perioste est une membrane
 Cellulaire, formée de lames et de fibres
 qui n'affectent aucune direction constante
 il n'est point particulier aux os, il
 s'étend sur les cartilages, les ligaments,
 ou plutôt les ligaments en sont des
 emanations; il est de même structure
 que le ~~et une prolongation~~ du tissu Cellulaire
 inter-musculaire; il en est un prolongement
 celui-ci entoure

le tissu Cellulaire entourant les muscles et pénètre dans leur
 substance, entre leurs fibres; Comme
 celui-là entoure les os, les pénètre.
 Il se prend dans les mailles ou Cellules du
 tissu Spongieux, dans les Cellules osseuses,
 et les grandes Cavités des os. Car la
 membrane de la moelle, du Sue moelleux,
 ou le perioste interne, sont une continuation
 du perioste externe.

il se joint à los, plus étroitement à
 sa substance la moins compacte ou il
 est plus épais, il est plus épais dans les jeunes
 sujets que dans les vieux il enveloppe les
 epiphyses, ^{et y jette beaucoup de fibres} passe entre-elles et les corps
 de los, et y disparaît avec l'âge quand
 elles sont jointes à los. on peut à l'aide
 de la

de la malération le diviser en plusieurs
lames surtout lorsqu'il a été tamisé
sur une fracturée ou à l'occasion d'une
contusion. les lames internes paroissent
alors approcher davantage de la
nature du cartilage pour la blancheur,
la solidité que les extérieures. il n'est
pas sur que la structure ne varie pas
d'un os à un autre os d'espèce différente,
les fibres se déchirent plus facilement
suivant la rectitude des os longs, qu'en
travers (a). on a avancé que les vaisseaux
sanguins supérieurs étoient invisibles (b)
mais j'en ai vu bien sensiblement,
et sans veines dans le pericrane d'un
jeune homme de 25 ans dans le
quel je suivais les vaisseaux qui vont
au os. et myself les avoit connus,
quelques tendons pénètrent à travers
le périoste jusque dans la substance
spongieuse, ils en interrompent l'organi-
sation feuilletée (c) Cette adhérence des
tendons au os est plus forte dans les
vieux que dans les jeunes sujets, parce
que leur implantation dans les os s'ossifie (d).
enfin le périoste que l'on a cru jusqu'à
m. Haller d'une sensibilité exquise n'est qu'une
peu plus sensible que la liste cellulaire dont

- (a) Ces remarques sont les uns de m.
les autres de m. Rouget et de m.
(b) premier mem de m. Rouget
44.
(c) C'est une chose dont m. Rouget
assure n. mem pas 50.
(d) voir un mem de m. de la Bone.

~~il est sensible et qui n'est pas sensible~~
 il est seulement sensible dans quelques
 endroits à cause des filets de nerfs qui
 y passent et quand il est enflammé
 il est destiné à envelopper, à pénétrer
 les os, à y porter les vaisseaux, les nerfs,
 à y reprendre la terre, la graisse, la colle
 laide phosphorique qui les pénètre, et
 la matière de leur nourriture et à
 les conserver et les réparer

19. on découvre sensiblement dans
 les os des artères et des veines sanguines;

nous rangerons les artères sous trois
 classes. les unes sont communes aux
 os et aux parties voisines; ^{qui sont des parties molles} les autres
 traversent seulement les os sans s'y
 distribuer; les 3^{es} s'y répandent et
 leur sont particulièrement affectées.

artères communes aux
 os et aux parties voisines.

20. les artères communes aux os,
 et aux parties voisines des os, sont
 distribuées différemment ^{dans les os que} par rapport
 aux os. il y en a qui reçoivent à la
 surface même des os, dans des
 sillons plus ou moins profonds; telles
 sont les artères de la dure-mère;

les artères



les arteres intercostalles, ^{elles jettent} tant les
unes que les autres ~~elles jettent~~ des
rameaux dans les os par des trous
delies que l'on remarque. Car el
la dans le trajet de ces sillons.
j'ai vu de ces trous bien sensibles
et très frequents dans le crâne
d'une fille de 22 ans, qu'un cancer
à la joue d'un volume enorme
fit perir. Les arteres se distribuent
aussi comme nous l'avons dit aux parties
voisines des os, celles de la dure-mere,
par exemple. a la dure mere meme.
les intercostalles jettent en même
tems des rameaux dans les côtes,
à la pleure dans les différentes
lames de la quelle ils se distrib-
uent, ainsi qu'au perioste des
côtes (a). il resulte de cette
distribution que dans les cas ou
ou des obstacles s'opposent au
cours du sang dans les ramifications
offuses de ces arteres, il est reverse
une plus grande quantité de
ce

(a) nuyseh epistola. sexta. tom 1.
21, pl 2 fig 2^a.

Ce fluide sur la dure-mère, ou sur la plevre, suivant la partie qui est affectée, et que dans l'un ou l'autre ne passe qu'avec difficulté dans les ramifications membraneuses de l'artère épineuse, ou de l'artère intercostale, il s'en porte nécessairement d'avantage dans les ramifications de ces artères qui vont aux os.

on peut expliquer par là, pourquoi certaines maladies se transmettent si facilement des parties molles aux os. Les bons effets que certains médicaments opèrent sur les os, en agissant préalablement sur les parties molles, qui les entourent. et pour quoi ^{certaines} tumeurs des os, ou exostoses, offrent des trous considérables par ou passent de gros vaisseaux. Trous que l'on ne découvre point avec cette étendue dans l'état naturel.

Ce n'est pas seulement par des sillons que les artères communes aux os et aux parties voisines pénètrent dans



Dans les os, les os plats dont on vient
 de parler en reçoivent encore par
 le reste de leur surface, tant à
 leur face, interne, qu'à leur face
 externe. C'est ce dont il est facile
 de s'assurer en dépouillant les os
 de leur périoste, ou de leur ^{ur}perioste
 dans l'animal vivant. Dans le cas,
 on en voit sortir ça et là des
 gouttes de sang, d'une infinité de
 points de leur surface; beaucoup
 plus cependant ^{des futures} ou les vaisseaux communs
 sont plus gros que d'ailleurs; et l'on
 remarque que plus les animaux sont
 jeunes, ou le qui revient au même,
 plus leurs os sont tendres; plus il en
 découle de ces gouttes sanguines. au
 contraire plus ils sont âgés, plus leurs
 os sont secs et durs, et moins il en
 transude de gouttes de sang.

il y a donc, ^{De ces artères communes aux os et aux parties environnantes} ~~des artères~~ qui
 remplissent ~~la~~ la surface des
 os avant de s'y distribuer, et d'autres
 qui les pénètrent immédiatement
 et diversement.

Les dernières sont plus nombreuses
 et plus amples


(a) nouvelle orthologie imprimée à
Paris en 1689. pag 25

(b) Beloste chirurgien d'hôpital tom
1^{er} pag. 85. et suivantes Paris 1710.

et plus amples dans les jeunes sujets
que dans les adultes, et dans les vieillards.
D'où il suit que les vaisseaux si nombreux
dans l'enfance, si rares dans l'adulte
se sont oblitérés en grande partie
avec l'âge, au point que beaucoup
d'eux n'admettent plus de sang. mais
ces vaisseaux n'ont ^{en effet} été qu'oblitérés et
trop pressés, car ils reparoissent
dès que la dureté des os diminue,
et que la tumeur qui les comprimait
est enlevée. ils reparoissent, alors
quelques fois, de manière qu'on les
détache de la surface des os, sous
la forme d'aigrettes, rependues dans
des bourgeons rougeâtres, leurs bords
est tournée du côté de l'os, leur sommet
repond à la pointe des bourgeons,
à la surface de l'os.

et cette pointe
est tournée vers

Ceci explique pourquoi les os
ramollis jusqu'à un certain point,
dans certaines maladies, se convert-
-issent quelques fois non seulement
en bourgeons rouges, qui ne sont point
de la chair comme on la croit ^{qui ne sont point} du sang
caille (a) ou du suc moelleux (b) ^{comme on l'a vu} sur
quoi



aigrette vasculaire des
bourgeons de substance spongieuse
qui croissent sur les dénudations

et
~~quoi on s'expliquera, mais pourquoi~~
 ils se transforment même en une
 masse rougeâtre, comme charnue,
 et forment dans certains cas, des
 tumeurs molles, faciles à saigner, —
 que l'on a désignées sous le nom impropre
d'exosto-sarcome.

mais Comment est-ce que tant d'artères,
 qui donnoient passage au sang —
 dans l'enfance, peuvent être oblitérées,
 comme elles le sont dans les os de
 l'adulte, sans cependant y exciter
 des troubles plus fréquents que ceux
 qu'elles y causent? Les vaisseaux —
 communs aux os et aux chairs, l'accro-
 -issement successif des parties hautes
 et des parties basses du corps, celui
 de certains os qui devancent que —
 l'on remarque dans les os qui croissent
 et se perfectionnent non seulement les
 uns après les autres, mais encore — dans les quels
 certaines parties d'un os sont formées
 avant d'autres parties du même
 os. Sont ce qui annulent les effets funestes
 de cette obliteration par rapport
 au

aux os à mesure qu'elle y a lieu.

en effet les vaisseaux communs
aux os et aux chairs, (quand leurs
branches, ou une certaine quantité
de leur branches qui vont aux os,
sont oblitérées), ^{ces vaisseaux communs dirigés} reçoivent par leurs
branches qui vont aux membranes
et aux chairs, le sang qui ne sauroit
plus passer dans les branches
oblitérées qui vont aux os. De là
vient que dans l'enfance, quand les
vaisseaux des os sont nombreux et
libres, les os tiennent sur le rouge; tandis
que dans l'homme fait, ils tiennent
plutôt sur le blanc. De là vient que
le sang détourné sur d'autres
parties par la difficulté qu'il a à
entrer dans les vaisseaux oblitérés
des os, sert à l'accroissement de ces
autres parties. Cette terre ainsi placée
sur certains vaisseaux des os qu'elle
bouche, ^{donc} produit ~~sur les vaisseaux~~
(qu'on me permette cette manière de m'exprimer)
~~languis~~ ~~qu'elle bouche~~ l'effet de
robinets qui diminueroient la
quantité du sang qui se porte
dans les

Dans les os, pour le verser sur d'autres parties. Ce qui conduit à cet accroissement successif, non seulement — de l'enfant, mais des os qui le composent; et qui plus est des différentes parties d'un même os. ainsi le réversement du sang sur d'autres parties, fait que les os ne souffrent point de l'oblitération des branches de ses vaisseaux communs avec les parties molles.

Si le sang n'entre plus dans les os comme auparavant, par tous ces vaisseaux, cela ne les empêche point de recevoir leur nourriture, d'autres artères plus considérables, mais moins nombreuses que les premières, qui pénètrent dans les os par des trous qui leur sont destinés, servent à les nourrir pendant le reste de la vie; au lieu que les premières leur sont plus particulièrement destinées pour leurs besoins avant l'âge adulte, et durant leur enfance, et de la première jeunesse. je parlerai de ces artères plus particulièrement affectées

affectées aux os; après que j'en —
 aurai décrit une autre espèce qui —
~~est encore commune aux os et aux~~
 parvient — aux parties molles, ~~sur lesquelles elle~~
~~parvient~~ après avoir traversé les os.
 et qui leur est commune.

21. les autres artères communes
 aux os, et ^{aux} parties molles; entrent
 dans les os par des trous ou des —
 conduits osseux d'une étendue plus
 considérable que ne font celles
 dont il a été parlé au paragra-
 -phe précédent; elles les parco-
 -urent durant un certain chemin.
 puis elles en sortent pour se distribuer
 aux parties molles; avant d'en —
 sortir, communément elles donnent
 quelques rameaux aux os dans les
 quels elles ont pénétré. De ce
 nombre sont l'artère maxillaire
 inférieure, l'artère maxillaire —
 supérieure; qui se distribuent à des
 parties molles, aux os des mâchoires,
 et aux dents.

arrêtons un moment à ce qui
 regarde

examinez la Carotide interne. Sçavez si dans
 l'os qu'elle fait son passage dans le temporal
 elle se détache par quelques rameaux pour les os
 examinez de même l'artère qui passe dans les trous
 de la apophyse transverse de chaque vertèbre Cervicale
 l'artère vertébrale.



regarde la distribution de l'artère
maxillaire inférieure dans la
machoire, afin de faire connoître
l'utilité dont il est d'être instruit
du cours de certaines artères dans
les os.

Cette artère entre dans le
conduit de l'os maxillaire inférieur
par la face interne de la branche
de cet os, elle se distribue à l'os
maxillaire inférieur, aux ^{dents} qui
précèdent le trou mentonnier,
elle sort par le trou mentonnier,
après avoir poussé un rameau
vers la symphyse du menton,
et qui ^{lui-même} donne des artères aux
dents antérieures.

La Carie qui fait perdre fréquemment
les ^{dents} de la mâchoire inférieure en amène
d'autres, les hémorragies opiniâtres,
qui suivent quelquefois l'extirpation
de ces dents, et certaines tumeurs
fungueuses souvent rebelles, quelque
fois malignes, qui affectent la mâchoire
inférieure.

qu'il en résulte d'inconveniens
arems

^{et situées}
inférieures (précisément d'après
un concours nombreux d'observations
en arrière du trou mentionné. —
tout cela montre que s'il y a des
arteres qui peuvent être oblitérées,
dans les os comme on la remarque
au paragraphe précédent, qu'il
y en a d'autres de la nature de celles
dont nous parlons ici, dont
l'oblitération ~~est point~~ conduit
à des accidens plus ou moins
considérables.

22. Voilà pour les arteres com-
-unes aux os et aux parties voisines
des os. j'en ai que peu de choses à
dire de celles qui traversent simple-
-ment certains os pour se rendre
à d'autres



le trou mentionné se trouve communément dans l'enfance et la jeunesse à la ve-
-sicle molaire; dans d'autres circonstances mais plus rarement et surtout dans
l'âge avancé à la 2^e petite molaire.
la distance entre l'entrée du conduit maxillaire et le trou mentionné dans
l'os est d'environ deux lignes. Combien de fois ne peuvent-elles pas comprimer l'artere
maxillaire dans le trajet ou à la sortie. Et 2 remarques seront portées dans le morceau
qui traitera de la tumeur fongueuse de la mâchoire inférieure
felles plates de chirurgie pag. 238 du même recueil, miscellanea medica
physica pag. 33 Altit de medica pag. 34 Sur les fongues de la mâchoire inf.

D'autres parties. je remarquai —
 Seulement par rapport à ces artères
 que dans les cas où les trous dans
 lesquels elles s'engagent deviennent
 trop étroits ces trous les étouffent.
 ainsi que les veines si l'on y presse
 ce qui dérange la distribution du sang.

23 quant aux artères qui pénètrent
 dans les os et qui leur sont plus spécialement
 affectées, il y en a qui ont été remarquées
 par Clopton havers, elles entrent par
 des trous qui sont aux extrémités
 des os longs; il y en a de plus grosses
 encore celles-ci pénètrent dans les
 os longs par des trous ou conduits
 obliques qui sont vers le milieu de
 leur longueur; ou vers le milieu
 des os plats.

toutes ces artères prennent en —
 entrant dans les os une gaine du
 périoste (a). les premières je veux
 dire celles qui entrent par les bouts des
 os se répandent dans les cellules osseuses
 des extrémités des os longs, la plupart

des anatomistes

(a) C'est une remarque de Mr
 Bertin à qui nous devons une belle
 description des artères des os traitée
 d'ostéologie tom première.

il faudrait injecter les artères qui
 vont aux os dans un fœtus et dans
 un nouveau né c.à.d. avant que
 les os soient dans l'état de y suivre
 plus avant.

Des anatomistes admettent dans les
 Cellules, une espèce de bourse membraneuse
 qui les tapisse. Raysek a recherché
 ces bourses sans succès, et il en nie
 l'existence (a) mais Mr Bertin qui
 a poursuivi les vaisseaux des os, en
 a en particulier et cette membrane
 dans les os ramollis des rachitiques, et
 ensuite dans les os des personnes saines,
 à fait sur les vaisseaux et sur cette
 membrane, les observations suivantes.
 après avoir injecté les vaisseaux de
 plusieurs enfants morts, à la suite
 du rachitis, et les avoir poursuivis dans
 leurs os, il les trouva " presque tous
 " comme flottans dans la cavité de
 " chaque Cellule et libres de toute
 " adhérence intime aux surfaces —
 " des Cellules. les principaux rameaux
 " de ces vaisseaux flottans, en jettent
 " de toutes parts de très petits, dont
 " quelques uns semblent par leur
 " dernière extrémité, unis à la
 " substance des Cellules,
 les membranes dont les Cellules
 offuses sont tapissées sont simplement
 flottantes



flotantes dans ces Cellules, elles y forment
 des espèces de franges qui ne sont
 adhérentes que par quelque filets.
 par ou l'on voit contre l'opinion la
 plus généralement adoptée que
 les Cellules, et le tissu osseux ne sont pas
 précisément tapissés de membranes, puis
 qu'il est certain qu'une portion de leur
 surface est nue. et contre l'apportion
 de Ray Sch, que les Cellules osseuses ne sont
 cependant pas destituées de toutes —
 membranes. Ces artères, ces ^{bourfes} Cellules ^{à ce que l'on croit.}
 membraneuses, et les franges sont plus particulièrement
 destinées à la sécrétion du suc
 médullaire.

les Seondes artères destinées
 particulièrement aux ^{os} Cellules qui
 sont les plus grosses et qui entrent
 par des trous considérables, vont
 fixer notre attention.

il y a un trou vers le milieu
 des os longs, plus communément il
 est vers l'extrémité supérieure dans le
 tibia; assez souvent il y en a
 deux surtout dans le fémur, lors
 qu'il

femur, lors qu'il n'en a qu'un il est vers
 le milieu, et dans les Cas où il y en a
 deux, ils sont distribués l'un vers l'extré-
 mité supérieure, ~~de l'os~~, l'autre vers l'extré-
 mité inférieure de l'os. Les deux sont ~~embouchés~~
 d'un conduit plus long ou plus court,
 et plus ou moins oblique qui pénètre
 dans le canal de la moelle, il est fort
 court et presque droit dans le femur,
 le rayon, et le cubitus, plus long et
 plus oblique dans le tibia, son progrès
 est de bas en haut dans le femur, le
 cubitus, et le radius, et de haut en bas
 dans l'humérus, et le tibia, on ignore
 la raison de ces différences. Dans celui
 le dernier le conduit ne pénétre dans
 le canal de la moelle que vers le
 milieu de l'os: il passe dans les deux
 une artère, quelques fois deux, et une
 veine. L'artère de l'artère se divise en
 deux branches, lors qu'il est parvenue
 dans le canal de la moelle, l'une est
 la continuation de l'artère, elle se tend
 entre la membrane de la moelle et l'os.
 on ignore si elle pousse des rameaux dans
 l'os



46

7^e lor, palfin affirme qu'elle lui en
Donne, et lon peut en effet le penser
Sur ce qu'il y a des trous à la face
interne des os dans le Canal de la
moelle; et Sur ce que les os cylindriques
des animaux nourris avec de l'araline
de garenne rougissent aussi bien
intérieurement qu'extérieurement,
lon voit dans un fragment d'un
de ces os que m^r duhamel m'a
donné et qui avoit appartenu
à un porc qui avoit servi à ses
experiences, une couche rouge —
intérieurement, une autre couche
rouge mais plus faible extérieurement,
et entre elles deux une couche —
blanche fort étendue en comparaison des deux autres.

La seconde branche ^{de l'artère} de l'artère
qui s'engage dans le Conduit osseux
des os longs se divise elle même en
deux dans le Canal de la moelle
l'une des deux se rend sensiblement
sur les cloisons du Canal de la moelle,
l'autre branche fait angle avec
la première

(a) Decar 3. fig. 1^{re} tom 2.

premiere et se ramifie de même.
 Cette bifurcation anguleuse est constante
 elle avoit été remarquée par
 Clopton havers, elle l'a été depuis par
 Bertin. on ignore sa destination. on
 presume que les artères sont les
 organes de la secretion de la moelle
 dans l'adulte, et qu'elles servent dans
 le fœtus au developement du Corps -
 de l'os. Ces artères et les autres classes
 d'arteres qui se repandent dans les
 os s'anastomosent elles entre-elles
 c'est encore ce que l'on ignore. on
 sait seulement que certaines artères
 osseuses se repandent en queues de
 cheval sans que leur ramus forment
 des mailles entre eux c'est en effet
 ce que j'ai observé dans les bourgeons
 de substance spongieuse que j'ai
 obtenus lors de mes expériences relatives
 à l'exfoliation des os. et ce que ruysek
 a parfaitement exprimé dans le dessin
 qu'il donne des artères de l'artère d'un
~~jeune homme~~ (a) encore pres que
 cartilagineuse d'un jeune homme (a).
 Dans celle



² ^{qu'il donne}
Dans Celui des artères de la face interne
des différentes pièces du Sternum (a)
l'opinion de malpigi sur la distribution
des vaisseaux des os en raseau est elle
à rejeter comme les faits porteroient
à le croire, et comme quelques auteurs
l'avoient pensé. j'en le crois point
d'après quelques observations que j'ai
faites sur les os enflammés du crâne
de quelques enfans de 4 à 5 ans il
reçoit dans l'épaisseur de l'os à
leur surface externe des ramifications
artérielles
en mailles parfaitement distinctes
et je crois qu'il y a dans les os, ou
du moins dans certains os des distrib-
utions artérielles en mailles, d'autres
en queues de cheval.

voilà pour les artères des os, c'est
des vaisseaux qui leur apportent la
matière de leur développement dans
l'enfance et la jeunesse, ^{celle} de leur induration, dans le foetus, l'enfance et la
jeunesse celle de leur nourriture dans tout l'âge
comme dans l'adulte, et celle de la moelle et
du sue moelleux et dans tous les
états de l'adulte. quand ils sont
fracturés

43
(a) tom 2 de la 2. fig 3. pl 2.

Des os
rore 3
chose q
ms de
s. il f
tout
-afais

De la

Des veines des os.

si quelqu'un sait quel
chose d'après que le que
me dedire sur les veines
s. il faudra s'en assurer
tout ce seroit un travail
à faire.

fracturés Celle de leur réunion.

24. il est Certain qu'il y a des
Des vaisseaux qui rapportent le Super-
flu des humeurs que les artères ont
portées aux os, sur tout le Superflu
du sang. l'anatomie a fait peu de
progrès par rapport à ces vaisseaux.
on croit avoir remarqué des veines
sanguines aux extrémités des os longs
et qu'elles en sortent par des trous
différens de ceux par ou entrent les
artères. il y en a sur l'existence des quelles
on ne sauroit avoir de doute. Ce sont
celles qui en reviennent par les
conduits osseux qu'elles partagent avec
les artères. les os diffèrent en cela
de toutes les autres parties, qu'ils ont
beaucoup d'artères sur tout dans la
jeunesse et entour lems peu de veine;
alieu que les parties molles ont
généralement plus de veines que
d'artères.



De la moelle et du sue moelleux

25 la moelle et le sue moelleux
sont l'une et l'autre une substance
grasse inflammable, jaunâtre renfermée

Dans des

Dans des bourses membraneuses qui occupent la cavité des os cylindriques, les cellules et le vaisseau osseux qui sont aux extrémités des mêmes os.

La moëlle est plus épaisse que le suc osseux, c'est elle qui occupe le canal des os longs. Le suc osseux en occupe les extrémités, on en trouve aussi dans la plupart des os plats.

On a avancé j'en sais sur quel fondement que les osselets de l'oreille — étoient privés de moëlle; ce qu'il y a de certain, c'est que j'ai trouvé souvent un trou ou canal, dans la tête du marteau, et une cavité dans le corps et les deux branches de l'enclume qui ne me paroissent pas propres à d'autres usages qu'à contenir de la moëlle. j'en ai rien remarqué de semblable dans l'étrier.

La moëlle comprend deux parties. l'une molle et organisée ^{et plus ou moins} l'autre fluide qui est renfermée dans la première

La partie molle ou organisée est composée d'un amas de petites vessies, qui

à quel âge commence-t-on à trouver de la moëlle dans le canal des os longs?

Du suc osseux dans les extrémités longs et dans les cellules des os plats.

quelle différence y a-t-il entre la moëlle des jeunes gens quand on commence à remarquer dans leurs os, celle des adultes et celle des vieillards.

à quel âge commence-t-on à remarquer un canal pour la moëlle dans les os longs.

et des cellules pour le suc osseux dans les épiphyse et dans les os plats

De
(x) a

qui Communiquent toutes les unes
 avec les autres et qui toutes
 dans le canal des os longs sont comprises
 dans une enveloppe commune qui
 tapisse la cavité des os longs, les
 cellules, la membrane commune
 qui les enveloppent sont des produits
 osseux supérieurs qui percent jusque
 dans les cavités intérieures des os par
 les canaux obliques et sentilles qu'on
 y découvre par les trous sans nombre
 de leurs extrémités et par toutes
 les mailles de l'éponge des os. et
 supérieure lui-même. Comme nous
 l'avons vu n'est autre chose que
 du tissu cellulaire semblable et
 continue au tissu cellulaire du
 reste du corps.

Duverney
 (x) anat tom 1^{re} p. 341



Des parois des cellules de la
 moelle ~~selon Duverney~~ (x), il sort
 des conduits sécrétoires qui y
 déposent l'huile fine et délicate
 qu'ils ont séparée

on a soublonné un acide qui
 épaississait les sucs gras du corps
 pour

prouvença de la moelle ou —
de la graille. Sur ce que l'esprit de
nitre digéré quelque tems avec de
l'huile d'olive lui donne une consistance
suiffée et sur le que battue avec
du vin aigre elle prend la consistance
de moelle et c'est ce que l'on appelle
nutritum.

Cette moelle repend de l'os et se trouve
dans toute l'épaisseur des os, elle en
transfère continuellement comme
on peut le voir par les os des adultes
en tems chauds.

Ce n'est point le suc gras de
la moelle qui est sensible, c'est la
membrane de la moelle. Surtout
quand elle est enflammée, réduite
en fungus relachée par l'humidité.
Car il pénètre des nerfs jusqua
elle. il en pénètre dans la propre
substance des os qui vont au
porosité qui se repend et a
l'éponge dont ils sont composés.
Les premiers entrent par les canaux
offus avec une artère une veine

Sont enveloppés +

+ sont enveloppés conjointement
d'une gaine duperioite qui les
conduit jus que dans la
cavité des os. les autres péné-
trent par différents trous
qui sont à la surface des os,
plus apparents et plus nombreux
avant l'induration, après le
ramollissement, que dans
l'induration parfaite. Ce qui
fait que les os, même les os
sont ou sensibles ou ne le sont
suivant qu'ils sont dans l'un ou
dans les autres de les états;
Car les os ramollis jusqu'à la
carification sont infiniment
sensibles.

24 telles sont les parties et les
 substances qui entrent dans la Comp-
 -osition des os. occupons nous présent-
 -ement de leur formation, elle Comp-
 -rend trois objets principaux, leur
 accroissement en grosseur; leur ^{ou en largeur}
 accroissement en longueur; et leur
 induration. il est assez prouvé et
 c'est une chose généralement reçue
 aujourd'hui, que les os s'étendent en
 grosseur ^{et en longueur} ~~et en longueur~~ de même que
 les parties molles, tant qu'ils n'ont
 que la Consistance de membrane
 ou de Cartilage; C'est à dire qu'ils s'étendent
 comme les parties molles, par intus-
 -usception, à l'aide d'un Sue nourricier
 visqueux et nullement terreux. l'exis-
 -tence de ce Sue nourricier est démo-
 -ntrée par les expériences faites avec
 la machine de papin, à l'aide des-
 quelles on retire des os une grande
 quantité de ce Sue nourricier gelatin-
 eux. il est versé dans les mailles de
 l'éponge des os qu'il pénètre de toutes
 parts.



parts et qu'il étend en tous sens,
dans le moule particulier qui la
renferme et la contient, je veux dire
dans le peroste.

une fois que la terre des os commencent à se neutraliser et à se rassembler, elle se dépose d'abord dans ^{un ou} plusieurs points déterminés des os, cela est invariable. elle se dépose graduellement, non à la surface d'une pièce ou à l'une de ses extrémités, mais profondément vers le centre de chaque pièce. Dans la substance spongieuse le centre de dépôt de terre neutralisée, est un centre d'induration. les os longs en ont généralement trois; — l'un à la pièce principal ou du corps de l'os il est au milieu. les deux autres sont dans ^{le milieu des} ~~les~~ deux épiphyses, qui sont l'une à l'extrémité supérieure, l'autre à l'extrémité inférieure qui terminent chacun de ces os.

les os plats en ont un plus ou moins grand nombre. cela dépend de l'espèce d'os. le parietal en a un
le coronal

la 2^e vertèbre du col 56.
l'os plat,
les os
des isles 4

Coronal ^{deux, l'ethmoïde} ~~deux~~, les temporaux, chaque
vertèbre, chaque pièce de l'os saum
trois, l'occipital quatre, le sphénoïde
cinq. Ces Centres ^{différents} d'induration d'un même
os peuvent être regardés comme autant
de pîphies ou de moyens d'en produire —
jusqu'à un certain point l'accroissement ou en largeur ou en
longueur. Ce moyen n'est pas le seul, mais
il est celui dont l'effet est le plus marqué
et le plus considérable surtout dans
les os plats. ainsi pour juger de la formation
d'un os, et la conduire jusqu'à l'état —
de perfection au quel il est parvenu dans
l'adulte. il convient de suivre la —
formation de chacune des pièces dont
un os qui a plusieurs Centre d'induration
est composé, de voir ensuite comment
ces pièces distinctes se réunissent —
ensuite entre-elles pour ne plus —
former qu'un seul os. quant aux
os qui n'ont qu'un seul Centre d'indur
ation, comme le parietal, la rotule
il sera facile de juger de leur formation
par ce que nous dirons de la formation
d'une seule

D'une seule des pièces des os plats, qui
ont plusieurs centres d'induration, mais pour me faire bien entendre
cet objet capital — je prendrai pour exemple l'humérus la formation de l'humérus
dans les os longs ^{celle du} ~~le sternum~~ dans et j'expliquerai par ce qui regarde
~~les os plats~~ la formation des os plats et celle des os qui restent ni cylindriques ni plats.

La partie principale et les deux
épiphyes de l'humérus sont les trois
pièces dont il sera formé. La partie
principale s'indurcit la 1^{re} par le
centre, les épiphyses les dernières
et longtemps après la première —
encore par le centre. ~~de H. Lee~~ (a)
~~a remarque~~ que les épiphyses —
rougissent au centre et loin de leur
surface dans les animaux nourris de
garenne. C'est là dans les enfants que
l'on voit le premier point blanc —
d'induration comme c'est au centre
de la 1^{re} pièce.

Je sais si l'épiphyse d'en haut
s'indurcit avant celle d'en bas.

(a) premier mem. dans l'ouvrage page 6
dans de H. Lee.

mais ce 1^{er} point blanc, le centre
d'induration, au milieu de la 1^{re}
pièce, comme au milieu de l'humérus
des deux épiphyses de cet os, quand
ils y subsisteront. ^{ne} n'offrent encore
qu'un état imparfait d'induration
qui ne

qui ne suspend point encore même
 dans le point blanc ou dans le Centre
 d'induration, l'accroissement de l'éponge
 de cette 1^{re} pièce, ^{l'accroissement du je} par l'insusception
 au moyen du suc nourricier qui a
 encore la faculté d'y parvenir. à plus
 forte raison la même, ^{l'éponge croît-elle} par la
 même manière, partout à la surface
 là où elle n'aura point encore reçu de substance
 terreuse, ou si elle ^{en} a reçu partout
 ou elle n'en sera pas suffisamment couverte
 et comprimée, pour que la portion des
 vaisseaux qui vont ^{au corps des} des vaisseaux
 communs, aux os et aux parties molles,
 soit oblitérée dans les os. jusque là
 la nourriture se dépose dans l'éponge —
 de cette pièce principale, et se tend en
 tous sens d'avantage, là où elle est
 moins endurcie, c'est à ses deux surfaces,
 et surtout à ses deux extrémités. la —
 terre saturée se dépose en même —
 temps, et peu à peu elle durcit cette 1^{re}
 pièce, l'endurcissement gagne, du —
 Centre de l'éponge de cette 1^{re} pièce à
 ses deux surfaces, je veux dire interne
 ou du

ou du Côté du Canal de la moelle,
 et externe. et vers les deux —
 extrémités. mais comme l'éponge —
 dans toute son épaisseur est plutôt
 complètement endurcie vers la
 partie moyenne de la première
 pièce, qu'à ses extrémités, il s'en suit
 que la nourriture, cette nourriture
 qui la faisoit croître, lui est plutôt
 retranchée qu'à ses extrémités, qui
 continuent de grossir, et de s'allonger;
 jusqu'à ce que leur ^{endurcissement}
 particulier, ^{à son tour} retarde ^{mais} peu à peu et enfin
 suspende entièrement leur allongement.
 voilà pour la première pièce de l'humérus,
 celle du corps de l'os; les deux autres qui
 sont les épiphyses croissent dans le
 même ordre que la première pièce.
 par intus susception tant qu'elles
 ne sont qu'une éponge molle, ou
 peu endurcie. d'abord à la
 circonférence et aux extrémités,
 et à mesure qu'elles croissent elles
 s'endurcissent du centre à la
 circonférence et aux extrémités

C'est par

C'est par l'extrémité, par où elle
 regarde celle de l'apice principale
 qu'elle finit par Croûte et s'endurcit
~~et de là~~ et au moment où l'épiphyse
 va se souder à l'apice principale,
 l'extrémité respective de chacune
 de ces pièces est blanchâtre, grainée
 comme cartilagineuse, garnie d'élevations
 d'enfoncements, ces élévations dures
 s'enfoncent dans les élévations
 de l'autre pièce, le peroste qui avoit
 existé entre ces deux pièces, ne
 subsiste plus, on ne remarque pas
 de cartilages intermédiaires comme
 quelques sarras ont cru qu'il y en
 avoit, chaque pièce est entourée
 de cette substance blanchâtre comme
 cartilagineuse, dont je parle. C'est
 la substance spongieuse même, <sup>et le peroste
 qui sont</sup> amenés
 à cet état et seulement pour quel
 que temps, car non loin de là cet
 état cartilagineux disparaît, les deux
 éponges, celle de l'apice principale,
 et celle de l'épiphyse entrent en contact
 se joignent, s'unissent au point de se
 confondre.



Confondre l'une avec l'autre, et finissent
par se charger à l'endroit de leur —
union, d'une quantité de terre neutralisée
suffisante pour les affermir. et les souder

60.

Si dans l'homme fait on examine
l'humérus tant à l'extérieur ^{à l'extérieur} pour
rechercher les traces des cartilages,
de ces inégalités, de ces enfoncements,
de cette union des épiphyses à la —
pièce principale de l'os on ne
trouve point, on voit que les épiphyses
sont continuës au corps de l'os, et
intérieurement que les cellules osseuses
des épiphyses communiquent avec
celles du corps de l'os, ainsi voilà
trois pièces autre fois distinctes —
antées les unes avec les autres, qui
maintenant ne forment plus —
qu'un seul et même os. +

D'où il suit, ^{à quel os} d'abord muqueux,
puis comme membraneux, ensuite
comme cartilagineux, composé d'éponge,
de vaisseaux sans nombre, de nerfs,
environné par l'os périoste. distribué
en trois pièces se nomme l'os croûte dans chacune de leurs dimensions

+ les épiphyses peuvent se
séparer à 14 et 20 ans et même
au-delà. Ce qui fait connoître
jusqu'à quel âge les os s'allongent
et jusqu'à quel âge on peut être
exposé au dédoublement de ces
pièces.

toutes

for
des os
ni

+ mais à part

toutes ses dimensions par intussusception
au moyen d'un suc alimentaire visqueux
qui ne se reprend pour son accroissement
qu'autant que la terre Neutralisée des
os ne met pas un obstacle à l'accroissement
~~de son épaisseur~~ de ses trois éponges qu'en suite
après que chacune d'elles ont pris leurs
croissances et se sont presque durcies,
elles finissent par se confondre. en sorte
que le grand accroissement des os en
longueur vient de cette réunion,
que la durée de leur croissance commence
par le Centre de ces trois pièces, et
à dire par le Corps et par les deux
extrémités, et qu'elle finit presque
par ses parties moyennes Supérieures
et inférieures. et que cette réunion —
offre déjà un exemple frappant de
soudure qui a beaucoup de rapport —
prima avec les soudures de certaines
fractures ou les Calus, Secundo avec
certaines soudures des articulations
ou certaines espèces d'ankyloses.

28

28 quant à la formation des autres

formation des os plats et
des os qui ne sont ni plats
ni cylindriques.

os; des os
à celle des os



et à celle

67.

os plats, des os d'une forme irrégulière
et qui ne sont ni plats, ni cylindriques. elle adabord beaucoup de rapport
ils passent tous ^{Communs aux cylindriques} de l'état mou, à — avec elle des os cylindriques
celui de membrane, puis à celui d'une
substance rembrunie comme l'arti-
-lagineuse, c'est alors que le ponce des
os croit encore plus, que le périoste qui
les enveloppe, les pénètre, ainsi que
les vaisseaux qui leur sont communs
et aux parties molles, et ceux qui
leur sont propres se développent
par intussusception au moyen du suc
nourricier qui est commun à toutes
nos parties; dans cet état d'ossification,
leur accroissement est rapide, tous
ces états sont autant de degrés —
particuliers d'ossification, qui —
précèdent, et doivent nécessairement
précéder cette autre circonstance
de l'ossification que nous appellerons
simplement induration. ils conduisent
au développement de cette éponge des
os, qui doit recevoir la terre neutralisée
qui les endurcit. Sans cette éponge, tout
dépôt terreux quelque part ou il se porte
dans le corps.

note: la matière osseuse se distribue
tout dans le commencement aux parties
par rayons divergens et chaque rayon per-
ché au vaisseau plein de cette matière. on
chacun de ces rayons il se repartit
des vaisseaux par la suite. l'ossification
j'ai que cette terre ^{est} interposée dans le
et ne sert point à son accroissement ou
autres sens c'est qu'en enlevant la
terre de l'éponge avec l'acide on ne
diminue point pour cela le volume
l'éponge tant qu'elle conserve de l'hu-
-te.

Dans le Corps humain, n'est point un
 os, c'est ou une pierre qui a seulement
 un bati; ou support muqueux non organisé
 ou une incrustation qui a pour support
 une tunique, une membrane, un
 muscle ou un tendon. quand l'éponge
 des os est ~~faite comme~~ amenée
 au point qu'on vient de dire et que
 la terre neutralisée commence à
 s'y déposer cette éponge continue de
 croître toujours par intussusception
 tant qu'elle continue d'avoir de
 la souplesse; et que la terre dont
 elle est pénétrée et qui l'endurcit
 ne la surcharge point encore
 trop. mais lors que cette terre
 neutralisée, ou cédée des os, commence
 à s'y déposer, ce n'est plus précisément
 dans le même ordre que nous
 avons vu que cela se faisait dans
 les os longs: il est bien vrai que
 le dépôt terreux se fait toujours par
 des points blancs ou centres d'indur-
 cation qui vont toujours croissant
 à leur

à leur Conférence, et on —
 épaisseur. mais ensuite dans —
 plusieurs de ces os, les dépôts ^{de terre} ont
 une marche particulière.

il y a parmi les os ^{pour entendre ce qui va se passer} qui ne sont
 point ~~ceux-ci~~ ^{qui se trouvent} une distinction
 à faire, les uns sont paires, c'est à
 dire qu'il y en a un d'un côté —
 du corps, l'autre de l'autre côté; comme
 un parietal droit, un gauche,
 une omoplate droite une gauche.
 un humerus droit un gauche ainsi
 du reste. ceux-ci sont ordinairement
 symétriques, l'un par rapport à l'autre;
 c'est-à-dire que les parties qui se trouvent
 dans l'un de ces os pour le côté droit,
 se trouvent aussi dans les analogues
 pour le côté gauche; avec cette —
 différence seulement, que les objets
 y sont dans un ordre renversé non
 pas de haut en bas, mais d'un côté
 par rapport à l'autre côté.

les autres os ne sont point
 paires comme les précédents mais
 sont impaires

pour entendre ce qui va se passer
 dans les differens os plats et
 irreguliers, il faut ne pas perdre
 de vue la difference qu'il y a
 entre les os pairs et les os impairs
 et les os pairs de l'adulte. Cette
 autre difference qu'il y a dans
 certains os impairs, lors qu'ils s'endurcissent,
 entre les centres d'induration —
 pairs et les centres d'induration
 impairs. en effet il y a parmi

il y a parmi les 246^{os} qui composent
 invariablement le squelette de l'homme,
 ou celui de la femme; des os impairs,
 et des os pairs; les premiers au
 nombre de 34 sont tous situés dans
 le plan de division du corps en le —
 prenant de haut en bas et appartienn —
 ent seulement à la tête et au tronc.
 Ce sont le coronal, l'occipital, l'éthmoïde,
 le sphénoïde, le vomer, la mâchoire
 inférieure, l'hyoïde, les 24 vertèbres
 l'alburn, le sternum et son appendice
 xyphoïde. la moitié de ^{chaque} ces os qui
 répond au côté droit est semblable
 à l'autre moitié de chaque des —
 mêmes os qui répond au côté gauche.
 Les 212 autres os sont distribués —
 par paires, 106 d'un côté 106 de l'autre
 côté, ceux ci sont ordinairement —
 symétriques l'un par rapport à l'autre
 c.à.d. que les parties qui se trouvent
 dans l'un de ces os pour le côté droit,
 se trouvent aussi dans son analogue
 pour le côté gauche; avec cette —
 difference seulement que les objets
 y sont

66
y sont dans un ordre renversé
non pas de haut en bas mais d'un
côté par rapport à l'autre.

parmi ~~ces~~ cette classe d'os que nous
~~reconnaissons~~ mettons au rang des
os impaires dans le squelette. il y
en a ~~plus~~ qui dans le fœtus —
l'enfant naissant et jusque dans
la jeunesse présentent des éléments
pour un même os qui sont paires;
une éponge ~~partie~~ distincte à droite,
une autre éponge également —
distincte à gauche, un point ou —
centre d'induration dans l'éponge
droite, un autre centre d'induration
dans l'éponge gauche, ensuite de
quoi les deux éponges comme les deux
centres d'induration, se réunissent et
se confondent pour former de ces —
deux pièces qui étoient paires et symétriques
un os unique impair. tel est le —
Coronal, l'os maxillaire inférieur.

il y en a d'autres tels que le
Sternum qui sont toujours impairs
dans le fœtus.

Dans le fœtus, la jeune fille, ainsi que
 dans l'adulte. en se formant comme
 après être formée; dont les éponges
~~sont multipliées~~ ^{entourent} les ~~joints~~
 d'induration multipliés et au
 nombre de ^{2^{ne}} ~~cinq~~ sont jamais
 les uns adroite les autres à gauche
 mais les uns au dessous des autres.

tandis qu'il en est, tel que l'occipital
 qui achevent leur ossification, c'est à
 dire leur accroissement et qui prennent
 leur induration à la manière de
 coronal, à l'aide de picles qui sont
 paires, et à la manière du sternum
 au moyen de picles impaires. les
 picles paires de cet os sont ^{2^{deux}} l'un au
 côté droit, l'autre au côté gauche,
 du grand trou occipital, elles sont
 symétriques et ce sont elles qui
 portent les condyles. les picles impaires
 sont également deux elles passent
 dans le plan du corps, l'une est au
 dessus du grand trou occipital, elle
 formera la partie de cet os qui va
 jusqu'à



jusqu'à son angle supérieur; l'autre
 est au dessus du grand trou —
 occipital elle forme l'apophyse basilaire.
 C'est encore dans cette classe qu'il faut
 placer l'éthmoïde, le sphénoïde —
 les vertèbres qui est composée de
 deux pièces latérales paires et d'une
 pièce du milieu impaire, le sphénoïde
 qui est formé de 4 pièces latérales
 paires de celle du milieu qui est
 impaire. les vertèbres et chaque
 vertèbre de l'os sacrum de deux pièces
 latérales symétriques et d'une
 pièce du milieu qui en fait le corps
 qui est impaire.

Dans les vertèbres, quand elles en
 sont à l'induration il y a des différences
 notables, à considérer qui regardent la première

Je vais par rapport à la première

revoie la 1^{re} vertèbre quand
 elle se forme

revoie la 2^{de} vertèbre

la 1^{re} par exemple qui tire son origine de
 3 pièces, une qui en doit faire le corps et deux
 latérales ou symétriques. Contre l'ordinaire de
 ce qui arrive aux autres os qui ont un corps et
 d'autres parties, ou l'est le corps qui est le premier
 endurci et formé, ici dans la première vertèbre,
 le corps est formé et endurci après les deux côtes.

la 2^{de} est composée de 6 pièces originales ou
 de six à l'induration 2 pour le corps un en haut
 l'autre en bas et deux pour les côtes un de
 chaque côté, l'apophyse odontoides en partie incluse
 a une épiphyse ce qui fait que la 1^{re}

34

de

re

no



ely

1892

174

rel

六

27

7

2

34

34



34

34

34

l'avertu et les talents Supérieurs
la fait dependre de la transformation
superiorite en os.

quand à la premiere opinion —
à l'existence d'un Sue osseux qui se Coagule
et se partit. on peut dire ~~prima~~ que
l'on ne voit point dans les os de quelque
maniere qu'on les examine, d'autre
Substance en outre des parties —
molles, qu'un Sue nourricier epais, —
visqueux, que l'on y trouve en abondance
et dans tous les tems. De la moelle, ou
du Sue moelleux, ^{mais} qui ne commence à
paroître ~~qu'à~~ ^{qu'à} * un certain âge;
~~et enfin qu'un~~ ^{et enfin qu'un} Sel neutre à l'ere —
Calcaire, qui ne commence à se déposer —
dans leur eponge, que quand ^{après avoir acquis} ~~avant~~
un certain volume elle a déjà pris
la forme de l'os. ^{alors} ~~et que~~ Ce Sue nourricier
est le Sue nourricier est ce qui accroît
et entretient, la ~~grande~~ moelle ce qui
donne la souplesse à l'eponge des os, et
d'effend leur Sel contre l'action de —
Certains dissolvants aqueux; leur Sel
ce qui les endurecit. et que le Sel ne
fait point

* auquel l'ere de l'avis, et a)
l'ere de la formation des os.
est le que l'on commence à
remarquer de la moelle dans
os lors du Sue moelleux d'ad)
les os plats. c)
le
il p

et a) adri. Spigelius de formatio foetus
 p. 17. il faudra revoir quelle sont les
 os dont il se sert pour la combatue.

et b) anat. plantarum.

c) il y a sur cette matière 4 memoires
 le 4e mem de l'acad est de 1743 p. 64
 il faudra les relire tous les quatre.

fait point l'ossification ni les os ^{qui est} mais seulement
 une ^{partie} dans l'ossification ^{en ce qui} ~~qu'est~~ de
 leur donner ^{aux os} de la solidité qu'il n'auraient
 point sans lui.

quant à la transformation du
 perioste en os. ^{cette opinion} assurément appartient
 à Mr Duhamel qui ^{l'appuie} la fonde sur de
 nombreuses experiences et en cela il ne
 tient rien de ^{ceux qui l'ont précédé} ~~l'opinion~~ on ne peut
 cependant pas se dissimuler, quelle
 avoit déjà été admise par des anatom-
 -istes antérieurs à Spigel (a) et que
 le dernier auteur l'avoit combattue.
 nous ajouterons que ^{c'est} ~~et depuis~~ malpighi qui paroit avoir
 avancé le premier (b) que les os sont
 formés d'écailles ou de lames osseuses.
 Cela pose metons l'opinion de monsieur
 Duhamel dans tout son jour.

Selon lui les os croissent en
 grosseur par l'addition de couches osseuses,
 qui tiennent leur origine du perioste;
 comme le corps ligneux des arbres augm-
 -ente en grosseur par l'addition de
 couches ligneuses qui se forment dans
 l'écorce (c). ils croissent en longueur
 par un ~~autre~~ mécanisme très approchant
 de celui



D'habiles chirurgiens avoient demandé
à m^r duhamel l'explication de quantité
d'opérations de chirurgie, et d'observations
anatomiques qui leur paroissent inexpli-
-quables par ses principes il y satisfait dans
un 6^e mem. ann 1743 p 284. il considère
d'abord les os sains, puis il prend les phénomènes
des os malades, les ankyloses, les exostoses, les
caries, les fractures les rachitis, le ramollissement
des os les exfoliations le tout soutenu à
l'ordinaire par l'analogie de ce qui arrive aux
arbres.

(b) mem del'alad 1743 p. 91 c'est l'opinion de
m^r duhamel c'est aussi celle de Savers que
tant que les os sont mous ils croissent par
intussusception

de celui qui s'observe pour pour
l'allongement du corps ligneux de
les bourgeons des arbres (a). d'abord ils
croissent par intussusception, ensuite par
super addition de différentes lames du-
periole. Car le periole dans cette opinion
est censé composé de différentes lames
et les lames sont elles mêmes censées
s'ossifier. m^r haller, Deltheuf, Bordenave
ont proposé leurs doutes au s^r savant dont
nous parlons contre son opinion. m^r de
delalad des Sciences
fougeroux s'est chargé de répondre à
ces doutes par des expériences, dont le
résultat est suivant le s^r savant académicien
et en confirmation des recherches de
m^r duhamel

que tant que les os sont mous ils s'étendent
dans toute sa longueur, que cette propriété
diminue à mesure que l'endurcisse-
ment fait du progrès, quelle cette
aux endroits où l'endurcissement
est parfait, quelle continue à ceux
où elle ne l'est pas.

que leur endurcissement dans les os
longs commence à leur parties moyennes,
et dans leur intérieur sous le periole.
on suppose ici profondément et loin du
periole des lames intérieures qui ne sont
point

(a) premier mem de ms fougereux
pag 44.

point les peristes mais le cartilage ou le jonges
delos, des lames interieures qui s'ossifient
les premieres. elles sont fortifiees par la
superaddition des lames interieures du
peristes, qui en s'ossifiant augmentent
le paisseur delos. et comme les interi-
eures sont pensees s'endurcir les
premieres, celles qui sont en dehors les
dernieres, il suit de la que les dernieres
continuent de s'allonger quand les
autres ne croissent plus.

il faut convenir que plusieurs faits
semblent prouver que les os sont en
effet formes par couches, sçavoir les fauillets
qui s'en detachent dans les exfoliations,
les gerures que l'on remarque quelques
fois ^{quand ils sont} dans les os desseches, gerures qui se
font en long et laide desquelles ils
s'en vont en fauillets. C'est encore

l'experience suivante qui est de mr.
fougereux. <sup>qui portoit a croire qu'ils ont fauillets et croit
par couches concentriques comme les arbres.</sup> C'est avant, apres avoir sçeu

Suivant sa longueur un os de boeuf,
lavoir en avoir enlevé la terre avec
laide nitreux, en jette le jongs
dans leau bouillante ou elle se
separat en fauillets (a).

or dou prolident les fauillets supposes
il paroît bien prouvé d'après les recherches de
mr.



Mr Duhamel, et les observations

confirmatives, de Mr Desfontaines

que quand une fois les os n'ont plus besoin de

croûte qu'en épaisseur, il étoit son allongement

en la partie du périoste, qui s'applique,

par couches, après avoir passé de l'état

de membrane à celui de cartilage —

propre à devenir os. C'est alors que le

cartilage super ajoute le charge de cette

substance salino-terreuse, qui ajoute

à ce cartilage la solidité osseuse.

+

44

confirmatives des recherches de
Mr Duhamel.

+ on peut rectifier Mr Duhamel et
Desfontaines

Le cartilage est formé et de
l'éponge, et du périoste amené
à un certain degré de spirituosité
d'épaisseur. mais le périoste qui
fait cela, est le périoste qui
entre dans les os comme celui
qui les enveloppe.

